

# CANCRO DELL'OVAIA: I DATI OBIETTIVI

## COS'È IL CANCRO DELL'OVAIA?

Il cancro dell'ovaia è un tumore che colpisce le ovaie della donna. Circa il 90 per cento dei tumori delle ovaie inizia sul rivestimento esterno dell'ovaia. Si parla in tal caso di cancro epiteliale dell'ovaia.

Il cancro dell'ovaia è una malattia relativamente non comune, in quanto colpisce soltanto circa 1200 donne in Australia ogni anno. Ottocento donne muoiono a causa della malattia ogni anno.

## QUALI SONO I FATTORI DI RISCHIO PER IL CANCRO DELL'OVAIA?

Anche se non sappiamo esattamente cosa provoca il cancro dell'ovaia, è stato dimostrato che l'aumento dell'età è un fattore di rischio consolidato per la malattia, e infatti circa l'80 per cento dei casi si manifesta nelle donne che hanno compiuto i 50 anni.

Un numero limitato di donne (circa il 5-10 per cento di tutti i casi) presenterà un rischio maggiore perché ha precedenti in famiglia di cancro dell'ovaia. Il rischio in tali donne aumenta con l'aumentare del numero di parenti che hanno contratto la malattia.



**NATIONAL  
BREAST AND OVARIAN  
CANCER CENTRE**

[www.nbocc.org.au](http://www.nbocc.org.au)

## QUALI SONO I SINTOMI DEL CANCRO DELL'OVAIA E COSA PUOI FARE?

I sintomi del cancro dell'ovaia sono spesso vaghi e possono emulare quelli di altri disturbi. Ciò può rendere difficile diagnosticare il cancro dell'ovaia nelle fasi precoci della malattia. Un Pap test non può essere impiegato per individuare il cancro dell'ovaia.

La cosa migliore da fare per le donne è prestare attenzione ai sintomi che potrebbero indicare il cancro dell'ovaia e farsi visitare dal medico di famiglia se notano eventuali cambiamenti insoliti e duraturi.

I sintomi più comuni che potrebbero indicare un tumore dell'ovaia sono:

- gonfiore addominale/sensazione di sazietà
- perdita dell'appetito
- aumento di peso ingiustificato
- stitichezza
- bruciore di stomaco
- mal di schiena
- orinazione frequente
- dolore addominale/pelvico
- spossatezza.

Questi sintomi possono essere presenti anche con altre malattie. È importante fare analizzare eventuali sintomi insoliti o persistenti. Per determinare la causa dei sintomi, il medico di famiglia potrebbe prescriverti ulteriori analisi, quali, ad esempio, una ecografia.

Per maggiori informazioni visita il sito  
[www.ovariancancerprogram.org.au](http://www.ovariancancerprogram.org.au)

Realizzato dal National Breast Cancer Centre\* 2007

Sovvenzionato dal Department of Health and Ageing  
del governo federale australiano.

\* Da febbraio 2008 il Centro Nazionale per il Tumore al Seno che comprende il Programma per il Tumore all'Ovaia (NBCC) ha cambiato nome e viene ora conosciuto come Centro Nazionale per i Tumori al Seno e all'Ovaia (NBOCC)